

ATENCIÓN

PRESENCIA DE LA PULGUILLA DE LA PATATA *Epitrix similaris* (Gentner) EN ASTURIAS

La pulguilla de la patata es un pequeño coleóptero originario de América, considerado plaga de cuarentena. Afecta principalmente a la patata y otras solanáceas (berenjena, tomate, pimiento), pero también puede alimentarse en coles, lechuga, acelga, maíz y judía, entre otros.

En los tubérculos afectados se observan galerías sinuosas de aspecto acorchado ocasionadas por las larvas de la pulguilla. Los adultos se alimentan de las hojas en las que se observan diminutos agujeros circulares.

DAÑOS EN TUBÉRCULO



DAÑOS EN LAS HOJAS



RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL

- **Retirada y destrucción** de los **restos de cultivo** después de la cosecha.
- **Eliminación** de los **rebrotos de patata** de años anteriores.
- **Control de malas hierbas** que puedan ser hospedantes de la plaga, tanto dentro de la parcela de cultivo como en los bordes de la misma.
- **Rotación de cultivos**, evitando cultivar solanáceas en al menos dos o tres años.
- **Desinfección de la maquinaria** antes y después de trabajar en los campos de cultivo.
- **Gestión de los residuos en los almacenes de patata** procedentes del lavado y el cepillado.



**GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS**

**CONSEJERÍA DE DESARROLLO
RURAL Y RECURSOS NATURALES**

Si se detecta la presencia de pulguilla ponerse en contacto con **SANIDAD VEGETAL**:

Teléfonos: 985 105 630/985 105 63/985 105 618

Email: svegetal@asturias.org