

## RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PARA EL CONTROL DE *Epitrix* spp. EN CULTIVOS DE PATATA.

### Medidas culturales encaminadas a la erradicación y control de la plaga:

- **Retirada y destrucción** de los **restos de cultivo** después de la cosecha.
- **Eliminación** de los **rebrotos de patata** de años anteriores.
- **Control de las malas hierbas** que pueden ser hospedantes de la plaga, tanto dentro de la parcela del cultivo como de los bordes de la misma.
- **Rotación de cultivos**, evitando cultivar solanáceas al menos en dos años.
- **Desinfección de la maquinaria** antes y después de trabajar en una parcela posiblemente afectada.
- **Gestión de los residuos en los almacenes de patata** procedentes del lavado y el cepillado.

### Control químico en el cultivo en caso de su detección.

El control químico, pasa por la realización de tratamientos sobre los adultos invernantes con la finalidad de evitar su oviposición. Estos tratamientos se realizarán a la vista de los primeros daños en hoja y/o con la presencia de adultos.

Para estas aplicaciones se recomiendan las siguientes materias activas:

Materia activa	Modo de acción	Materia activa	Modo de acción
Acetamiprid	Neonicotinoide	Fosmet	Organofosforado
Alfacipermetrin	Piretroide	Imidacloprid	Neonicotinoide
Betaciflutrin	Piretroide	Lambda cihalotrin	Piretroide
Ciflutrin	Piretroide	Metaflumizona	Metaflumizona
Cipermetrin	Piretroide	Metil Clorpirifos	Organofosforado
Clorantraniliprol	Diamida	Spinosad	Spinosina
Clorpirifos	Organofosforado	Tiacloprid	Neonicotinoide
Clotianidina	Neonicotinoide	Tiametoxam	Neonicotinoide
Deltametrin	Piretroide	Zeta-cipermetrin	Piretroide
Esfenvalerato	Piretroide		

Hay que tener en cuenta que estas aplicaciones foliares, solo ejercen control sobre los adultos, no así en el resto de los estados de la pulgilla, ya que estos se desarrollan en el sistema radicular y se debe por ello recurrir a aplicaciones al suelo.

### **Aplicaciones al suelo.**

Cuando los ataques son importantes se aconseja realizar, además de las aplicaciones foliares, tratamientos al suelo con insecticidas en forma granulada, para ejercer control sobre larvas y pupas. Se pueden realizar dos aplicaciones una al levantar el cultivo y otra segunda previa a la plantación.

### **Productos a utilizar:**

<b>Materia activa</b>	<b>Modo de acción</b>
<b>Clorpirifos</b>	Organofosforado
<b>Metiocarb</b>	Carbamato
<b>Oxamilo</b>	Carbamato
<b>Teflutri</b>	Piretroide
<b>Etoprofos</b>	Organofosforados
<b>Lambda cihalotrin</b>	Piretroide